

医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	ピシャット
2	成分・分量	1. 2g×3包(成人の1日量)中 タンニン酸ベルベリン 300mg ロートエキス散20% 300mg(ロートエキスとして60mg)
3	用法・用量	1日3回を限度として、服用間隔は4時間以上おいてください。 15才以上(大人) 1回1包、11～15才未満 1回2/3包、 8～11才未満 1回1/2包、5～8才未満 1回1/3包、 3～5才未満 1回1/4包、3才未満 服用しないでください
4	効能・効果	腹痛を伴う下痢、下痢、消化不良による下痢、食あたり、水あたり、はき下し、くだり腹、軟便
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。 胃腸鎮痛鎮痙薬 2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがある) 次に該当する人はお申し出ください。 ・ 医師の治療を受けている方 ・ 発熱を伴う下痢のある方、血便のある方、又は粘液便の続く方 ・ 急性の激しい下痢又は腹痛・腹部膨満・はきけ等の症状を伴う下痢のある方(本剤で無理に下痢をとめるとかえって病気を悪化させることがある) ・ 妊婦又は妊娠していると思われる方 ・ 高齢者 ・ 本人又は家族がアレルギー体質の方 ・ 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある ・ 次の症状のある方 排尿困難 ・ 次の診断を受けた方 心臓病、緑内障 ・ ベラドンナ総アルカロイド、ヨウ化イソプロパミド、ロートエキスを含有している内服薬を服用している方
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。