


医薬品を正しく購入するための

説明文書

第二类医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

| | | |
|---|-----------------------|---|
| 1 | 名称 | 正露丸 (製造販売元  大幸薬品株式会社) |
| 2 | 成分・分量 | 9粒(成人の1日最大服用量)中、 日局 ^{もく} 木クレオソート 400mg、日局 アセンヤク末 200mg、 日局 オウバク末 300mg、日局 カンゾウ末 150mg、陳皮末 300mg |
| 3 | 用法・用量 | 1. 次の量を、1日3回、食後(なるべく30分以内)に必ず水またはお湯といっしょに服用してください。 成人(15才以上) 1回3粒、11才以上15才未満 1回2粒、8才以上11才未満 1回1.5粒、5才以上8才未満 1回1粒、5才未満 服用しないでください 2. むし歯痛には、1~1/2粒を歯窩(むし歯の穴)につめてください。 |
| 4 | 効能・効果 | 軟便、下痢、食あたり、水あたり、はき下し、くだり腹、消化不良による下痢、むし歯痛 |
| 5 | 保健衛生上の危害を防止するために必要な事項 | 1. 次の方は服用しないでください。 (1) 今までに本剤によるアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、むくみなど)を起こしたことがある方 (2) 5才未満の乳幼児(のどにつかえる恐れがあります) 2. 本剤を服用している間は、他の止瀉薬(下痢止め薬)を服用しないでください。 3. むし歯痛に使用する場合、本剤は一時的に痛みをとるのみで治療効果はありませんので、痛みが治まってもなるべく早く歯科医師の治療を受けてください。また、痛みがやわらげば、本剤をむし歯の穴から取り除き、決してつめたまま放置しないでください。 4. 本剤を「効能」以外の目的には使用しないでください。 次に該当する人はお申し出ください。 ・ 医師又は歯科医師の治療を受けておられる方 ・ 急性の激しい下痢、発熱を伴う下痢、血便、粘液便又は腹痛・腹部膨満・はきけなどの症状を伴う下痢のある方 ・ 妊婦、妊娠していると思われる方又は授乳中の方 ・ 高齢者 ・ 本人又は父母、兄弟姉妹がアレルギー体質の方 ・ 薬や化粧品などによるアレルギー症状を起こしたことがある方 ・ 肝臓や腎臓に疾患のある方 |
| 6 | 薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項 | |

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。