

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。



止瀉薬 ピシヤット

第2類医薬品

【特長】

- 通勤途中、会議中、移動中の突然の腹痛を伴う下痢に効果を発揮するお薬です。
- 携帯に便利なスティックタイプ、どこでものめる顆粒剤です。
- お口の中でさっと溶け、後味すっきり、フルーツ風味の顆粒剤です。
- 3才から服用できる顆粒剤です。

使用上の注意 ⚠

してはいけないこと ❌

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。
胃腸鎮痛鎮痙薬
2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。
(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがある)

相談すること 🗣️

1. 次の方は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている方
 - (2) 発熱を伴う下痢のある方、血便のある方、又は粘液便の続く方
 - (3) 急性の激しい下痢又は腹痛・腹部膨満・はきけ等の症状を伴う下痢のある方
(本剤で無理に下痢をとめるとかえって病気を悪化させることがある)
 - (4) 妊婦又は妊娠していると思われる方
 - (5) 高齢者
 - (6) 本人又は家族がアレルギー体質の方
 - (7) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある方
 - (8) 次の症状のある方
排尿困難
 - (9) 次の診断を受けた方
心臓病、緑内障
 - (10) ベラドンナ総アルカロイド、ヨウ化イソプロバミド、ロートエキスを含有している内服薬を服用している方
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
 - (2) 5～6日間服用しても症状が良くならない場合
3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。
口のかわき

その他の注意

母乳が出にくくなる場合があります。

(裏面もお読みください)

■効能・効果

腹痛を伴う下痢、下痢、消化不良による下痢、食あたり、水あたり、はき下し、くだり腹、軟便

■用法・用量

1日3回を限度として、服用間隔は4時間以上おいてください。

年 齢	1回量	1日服用回数
15才以上(大人)	1包	3回
11才以上15才未満	2/3包	
8才以上11才未満	1/2包	
5才以上8才未満	1/3包	
3才以上5才未満	1/4包	
3才未満	服用しないでください	

「用法・用量に関連する注意」

- (1)定められた用法・用量を必ず守ってください。
- (2)3才以上の小児に服用させる場合には、服用量の間違いを起こさないように保護者の監督のもとに服用させてください。

■成分・分量

1.2g×3包(成人の1日量)中、次の成分を含みます。

成 分	分 量	は た ら き
タンニン酸ベルベリン	300mg	殺菌作用と抗炎症作用で、腸内腐敗を抑えると共に、荒れた粘膜を保護します。
ロートエキス散20%	300mg (ロートエキスとして60mg)	腸の異常な運動(けいれん)を抑え、痛みをやわらげることで、腹痛を伴う下痢に効果を発揮します。

添加物として乳糖水和物、トウモロコシデンプン、キシリトール、ヒドロキシプロピルセルロース、クロスカルメロースナトリウム、軽質無水ケイ酸、タルク、エタノール、プロピレングリコール、グリセリン及び香料を含有します。

■保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (5)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返してなるべく湿気を防いで保管し、2日以内に服用してください。

本剤の服用により、変わった症状があらわれるなど、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

大幸薬品株式会社 お客様相談係：電話(06)6382-1095

受付時間：午前9時～午後5時(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
電話：0120-149-931