

服用に際しては、この説明書を必ずお読みください。  
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。



大幸薬品

止瀉薬  
**ピシヤット錠**

第2類医薬品

- 【特長】**
- 通勤・通学途中、会議中、移動中などの外出先で突然おこる下痢に、水なしでどこでものめるお薬です。
  - お口の中ですっきり溶けるフルーツミント風味。
  - 腹痛を伴う下痢に効果を発揮します。
  - 携帯に便利な PTP 包装。

### 【使用上の注意】⚠

#### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。  
胃腸鎮痛鎮痙薬
2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。  
(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがあります)

#### 相談すること

1. 次の方は本剤を服用する前に医師又は薬剤師に相談してください。
    - (1) 医師の治療を受けている方
    - (2) 発熱を伴う下痢のある方、血便のある方、又は粘液便の続く方
    - (3) 急性の激しい下痢又は腹痛・腹部膨満・はきけなどの症状を伴う下痢のある方  
(本剤で無理に下痢をとめるとかえって病気を悪化させることがあります)
    - (4) 妊婦又は妊娠していると思われる方
    - (5) 高齢者
    - (6) 本人又は家族がアレルギー体質の方
    - (7) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある方
  - (8) 次の症状のある方  
排尿困難
  - (9) 次の診断を受けた方  
心臓病、緑内障、フェニルケトン尿症
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

(2) 5～6日間服用しても症状が良くならない場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。

口のかわき

#### その他の注意

母乳が出にくくなる場合があります。

(裏面もお読みください)

### 【効能・効果】

腹痛を伴う下痢、下痢、消化不良による下痢、食あたり、水あたり、はき下し、くだり腹、軟便

### 【用法・用量】

次の量を噛みくだくか、口の中で溶かして服用してください。

年 令	1回量	1日服用回数	服用間隔
成人(15才以上)	1錠	3回を限度とする	4時間以上
15才未満	服用しないでください		

#### 【用法・用量に関連する注意】

- (1)定められた用法・用量を必ず守ってください。
- (2)錠剤の取り出し方は、右図のように錠剤の入っている PTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、錠剤を取り出してください。  
(誤ってシートごと飲み込むと、のどに突き刺さるなど思わぬ事故につながる場合があります。)

(PTPシートの取り出し図)



### 【成分・分量】

3錠(成人の1日最大服用量)中、次の成分を含みます。

成 分	分 量	は た ら き
日局 タンニン酸ベルリン	300mg	腸内の有害菌を殺菌して異常な腐敗を抑え、腸の粘膜を保護して炎症を抑えます。
ロートエキス3倍散	180mg (ロートエキスとして60mg)	胃腸の働きをコントロールする神経に作用して、腸の過剰な運動を抑え、痛みを抑えることで、腹痛を伴う下痢に効果を発揮します。
シャクヤク乾燥エキス	72mg (原生薬換算量504mg)	腸の過剰な運動を抑え、下痢の時におこる腹痛を和らげます。

添加物として、乳糖水和物、D-マンニトール、トウモロコシデンプン、結晶セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、クロスポビドン、二酸化ケイ素、軽質無水ケイ酸、アスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物)、トメントール、ステアリン酸Mg、香料、エタノールを含有します。

#### 【成分に関連する注意】

- (1)本剤は生薬を用いた製品のため、錠剤の色調や味が多少異なることがありますが、効果には変わりありません。
- (2)本剤に配合の「タンニン酸ベルリン」が黄色の成分のため、黄色の錠剤となっています。着色料は配合していません。

#### 【保管及び取扱い上の注意】

1. 小児の手の届かない所に保管してください。
2. 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器には絶対に入れかえないでください。
3. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
4. 使用期限を過ぎたものは、服用しないでください。

本剤の服用により、変わった症状があらわれるなど、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めの薬局、薬店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

大幸薬品株式会社 お客様相談係：電話(06)6382-1095

受付時間：午前9時～午後5時(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構

電話：0120-149-931

発 売 元  **大幸薬品株式会社** 大阪府吹田市内本町3-34-14

製造販売元 **共栄製薬工業株式会社** 富山県高岡市中田4576番地