

SEIROGAN®

Viên hoàn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.

Dạng bào chế:

Viên hoàn hình tròn, màu nâu, mềm.

Thành phần: Mỗi viên Seirogan có chứa những thành tố sau:

Creosote thảo mộc (<i>Creosotum</i> -Dược điển Nhật):	44,4 mg
Câu đắng (<i>Uncaria Gambir Roxb-</i> DĐN):	22,2 mg
Võ Hoàng bá (<i>Phellodendrom Cortex-</i> DĐN):	33,3 mg
Cam thảo (<i>Glycyrrhiza Radix</i> -DĐN):	16,7 mg
Trần bì (<i>Pericarpium Citri Reticulatae-</i> DĐN):	33,3 mg

Tá dược:

Cinnamomum Cortex (DĐN), Carmellose Calcium (DĐN), Glycerin nồng độ cao (DĐN).

Dược động học:

Đã tiến hành những nghiên cứu có đối chứng placebo trong các trường hợp dùng 1 liều đơn nhất, dùng liều tăng dần. Nam giới và nữ giới khỏe mạnh dùng *Creosotum* chiết từ gỗ theo các liều 45, 90, 135, 180 và 225 mg. Tmax trong trường hợp dùng liều trung bình là 135 mg creosote chiết từ gỗ là 0,5 giờ. Thời gian bán thải T_{1/2} khi dùng *Creosotum* chiết từ gỗ với liều trung bình là 135 mg là 2,2 giờ đối với o-cresol và 1,2 giờ với guaiacol.

Dược lực học:

Creosotum chiết từ gỗ có tác dụng úc chế các co bóp của vận động nhu động cơ trơn của ruột.

Creosotum chiết từ gỗ có tác dụng chống tiết dịch của ruột non đoạn trên và của đại tràng.

Các nghiên cứu trên người cho thấy, *Creosotum* chiết từ gỗ có tác dụng chống co bóp trong trường hợp tiêu chảy cấp tính.

Chỉ định:

Tiêu chảy, tiêu chảy do khó tiêu, tiêu chảy và nôn mửa, phân nhão.

Thận trọng khi dùng:

Phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú không dùng thuốc này nếu không có ý kiến bác sĩ.

Trẻ em dưới 5 tuổi không dùng thuốc này nếu không có ý kiến bác sĩ.

Bệnh nhân tiêu chảy kèm sốt cao phải được bác sĩ thăm khám trước khi dùng thuốc này.

Người bị bệnh gan hay thận phải được bác sĩ thăm khám trước khi dùng thuốc này.

Nếu dùng thuốc mà triệu chứng không mất, cần được bác sĩ thăm khám.

Phải được bác sĩ thăm khám nếu quý vị đang dùng một trị liệu khác.

Chống chỉ định:

Thuốc này chống chỉ định ở người có tiền sử thể hiện triệu chứng tăng mẩn cảm với *Seirogan* như: nổi ban, mẩn đỏ, ngứa và phù nề.

Không dùng thuốc chống tiêu chảy khác trong khi đang sử dụng *Seirogan*.

Tác dụng phụ:

Seirogan có thể gây phản ứng dị ứng như: ban, vùng da đỏ và ngứa. Ngừng dùng thuốc và tiếp xúc với bác sĩ.

Thông báo cho bác sĩ điều trị bất kỳ tác dụng phụ nào xảy ra khi dùng thuốc.

Liều lượng và cách dùng:

Liều *Seirogan* dưới đây được dùng một lần với nước ở nhiệt độ thường hay nước nóng sau mỗi bữa ăn (trong vòng 30 phút), mỗi ngày dùng 3 lần:

Không dùng quá liều khuyến nghị.

Tuổi	Liều dùng/1 lần
Từ 15 tuổi trở lên	3 viên
Từ 11 đến 14 tuổi	2 viên
Từ 8 đến 10 tuổi	1,5 viên
Từ 5 đến 7 tuổi	1 viên

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú không dùng thuốc này nếu không có ý kiến bác sĩ.

Tác động đến khả năng lái xe và vận hành máy móc:

Thuốc không ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc.

Quá liều:

Các dấu hiệu và các triệu chứng khi dùng quá liều (vào khoảng gấp 30 lần liều thường dùng) như sau: các triệu chứng thần kinh (nhức đầu, chóng mặt, co giật, hôn mê), các triệu chứng đường tiêu hóa (buồn nôn, nôn), các triệu chứng khác (tiết nhiều dịch nhầy, tổn thương tế bào, bợt da, niêm mạc, có tác dụng gây tê tại chỗ).

Cách điều trị: Rửa dạ dày.

Bảo quản và xử lý:

Để thuốc xa tầm tay trẻ em.

Nếu thuốc ngấm nhiên tiếp xúc với da: rửa kỹ với xà phòng và nước nóng.

Bảo quản ở chỗ mát, tránh ánh nắng trực tiếp.

Nếu *Seirogan* không đủ mềm và ẩm, phải kiểm tra ngày hết hạn.

Nắp chặt lọ thuốc sau mỗi lần dùng.

Hạn sử dụng:

5 năm kể từ ngày sản xuất. Không dùng thuốc đã hết hạn sử dụng ghi trên bao bì.

Tiêu chuẩn chất lượng:

Tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Các hoạt chất của *Seirogan* đều theo tiêu chuẩn JP (Dược điển Nhật Bản).

Trình bày:

Lọ 50 viên hoàn; Lọ 100 viên hoàn, trong hộp bìa cứng.

Nhà sản xuất: TAIKO PHARMACEUTICAL CO., LTD.

3-34-14 Uchihonmachi, Suita,
Osaka, 564-0032, JAPAN

(ベトナム向) 01013056